

Liste Kulturen mit N_{min}-Ermittlung nach der 4. bzw. 6. Kulturwoche

- Grundsätzlich muss vor der Düngung eine DBE für jede Kultur erstellt werden. Dazu muss der N-Gehalt der Fläche vor Kulturbeginn festgestellt werden. Bei einigen Kulturen darf der Düngbedarf der Kultur jedoch erst auf Grundlage des N-Gehalts im Boden nach der Vierten bzw. 6. Woche nach Kulturbeginn berücksichtigt werden.
- Von diesem Verfahren kann in begründeten Fällen abgewichen werden, wenn zum Beispiel die Kulturen im Damm angebaut werden oder abgedeckt sind oder bei Pflanzkulturen

Kultur	Probenahme für DBE in Kulturwoche	Ertragsniveau	Stickstoffbedarfswert	Probenahmetiefe	Abschläge auf Grund der Stickstoffnachlieferung aus den Ernteresten für die Folgekultur
Chicoréeerüben	4	450	135	90	40
Bund-Möhren,	4	600	115	60	10
Möhren, Industrie	6	900	165	90	45
Wasch-Möhren,	6	700	125	60	30
Pastinake	4	400	140	60	50
Petersilie, Blatt-, bis 1. Schnitt	4	240	160	60	10
Wurzel-Petersilie,	6	400	130	60	45
Schnittlauch, gesät, bis 1. Schnitt	6	300	210	60	10
Schnittlauch, Anbau für Treiberei	6	280	240	60	55
Schwarzwurzel	6	200	75	90	25
Bundzwiebel	4	680	210	30	15
Trockenzwiebel,	6	600	155	60	30